



## ORIGINAL ARTICLE

Received: 2020/11/03

Accepted: 2021/01/30

## Investigating Global and Regional Trends of DALY due to Cardiovascular Diseases Using Latent Growth Model

**Ahmad Heidari Behnouieh (M.Sc.)<sup>1</sup>, Hossein Fallahzadeh (Ph.D.)<sup>2</sup>, Ramin Malboosbaf(M.D.)<sup>3</sup>,  
Sara Jambarsang(Ph.D.)<sup>4</sup>**

1.M.Sc. of Biostatistics, Center for Healthcare Data Modeling, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

2.Professor of Biostatistics, Center for Healthcare Data Modeling, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

3.Assistant Professor, Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical science, Tehran, Iran.

4.Corresponding Author: Assistant Professor, Center for Healthcare Data Modeling, School of Public Health Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Email:s.jambarsang@yahoo.com Tel:09171091304

### Abstract

**Introduction:** The global trend of cardiovascular diseases is increasing. This study was conducted to investigate the global and regional trends of DALY due to cardiovascular diseases during 1990-2017.

**Methods:** In this modeling study, the global burden rate of diseases, injuries, and risk factors by years of disability, years of life with disability, and years of life lost due to premature death related to cardiovascular diseases during 1990 to 2017 in 195 countries as the study population, which was extracted from the IHME site.

**Results:** The growth rate of DALY due to cardiovascular diseases in the high-income region (growth rate coefficient = 450.85) was higher than other regions and the highest mean DALY rate due to cardiovascular diseases was for Central and Eastern Europe and Central Asia (mean rate = 106767) compared to other regions. Overall, the growth rate of DALY due to cardiovascular diseases in the regions of Latin America and the Caribbean, South Asia and Southeast Asia, East Asia and Oceania was positive and the growth rate of DALY due to cardiovascular diseases was negative in Central Europe, Eastern Europe and Central Asia, high-income countries, North Africa and the Middle East and sub-Saharan Africa.

**Conclusion:** The positive and negative trends observed in different economic regions indicate the need for planning to prevent cardiovascular diseases in lower income areas.

**Keywords:** Cardiovascular Disease, Latent Growth Model, Global Burden of Disease, Disability



#### This Paper Should be Cited as:

Author: Ahmad Heidari Behnouieh, Hossein Fallahzadeh, Ramin Malboosbaf, Sara Jambarsang. Investigating Global and Regional Trends of DALY due to Cardiovascular .....Tolooebehdasht Journal.2021;20(3):75-87 .[Persian]



## بررسی روند جهانی و منطقه‌ای دالی بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از مدل رشد پنهان

نویسنده‌گان: احمد حیدری بهنؤیه<sup>۱</sup>، حسین فلاح زاده<sup>۲</sup>، رامین ملبوس‌باف<sup>۳</sup>، سارا جام برستگ<sup>۴</sup>

۱. کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مدل سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي، يزد، ايران.

۲. استاد مرکز تحقیقات مدل سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي، يزد، اiran.

۳. استادیار مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اiran.

۴. نویسنده مسئول: استادیار مرکز تحقیقات مدل سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي، يزد، اiran. تلفن تماس: ۰۹۱۷۱۰۹۱۳۰۴ Email:s.jambarsang@gmail.com

## طیوع بهداشت

### چکیده

**مقدمه:** روند جهانی بیماری‌های قلبی-عروقی در حال افزایش است. این مطالعه جهت بررسی روند جهانی و منطقه‌ای دالی بیماری‌های قلبی-عروقی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ انجام شد.

**روش بررسی:** در این مطالعه مدل‌سازی، نرخ بار جهانی بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطر به وسیله سال‌های ناتوانی، سال‌های زندگی با ناتوانی و سال‌های زندگی از دست رفته به دلیل مرگ زودهنگام مربوط به بیماری قلبی و عروقی طی سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ مربوط به ۱۹۵ کشور جهان به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است که از سایت IHME استخراج شد.

**یافته‌ها:** ضریب رشد نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در منطقه با درآمد بالا (ضریب رشد نرخ = ۸۵/۴۵) نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده است و میانگین ثابت نرخ DALY بیماری قلبی عروقی برای منطقه اروپای مرکزی و شرقی و آسیای میانه (میانگین ثابت نرخ = ۳/۱۰۶۷۸) نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین مقدار است، در مجموع رشد نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در مناطق آمریکای لاتین و کارائیب، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه مثبت بوده است و ضرایب رشد نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در مناطق اروپای مرکزی، شرق اروپا و آسیای میانه، کشورهای با درآمد بالا، شمال آفریقا و خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا منفی بود.

**نتیجه گیری:** روند مثبت و منفی مشاهده شده در مناطق اقتصادی مختلف لزوم برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی را در مناطق کم درآمدتر نشان می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی:** بیماری قلبی عروقی، مدل رشد پنهان، بار جهانی بیماری‌ها، ناتوانی

دو ماهنامه علمی پژوهشی  
دانشکده بهداشت یزد

سال بیستم

شماره سوم

مرداد و شهریور ۱۴۰۰

شماره مسلسل: ۸۷

تاریخ وصول: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱



## مقدمه

علت مرگ و میر و ناتوانی هستند، به طوری که درصد از کل مرگ‌ها را به خود اختصاص داده اند(۸-۹).

بیماری‌های قلبی عروقی (CVD) پیش‌رونده بیماری غیرواگیر است، که ۵۰٪ از مرگ و میرهای مربوط به بیماری‌های غیرواگیر در جهان را تشکیل می‌دهد و مانع قابل توجهی برای توسعه پایدار انسانی است. این مهم قابل توجه است که، بخشی از بیماری‌های قلبی عروقی قابل پیشگیری است، رفتارهای قابل اصلاح مانند: الگوی غذایی ناسالم، مصرف دخانیات، بی تحرکی جسمی، عوامل استرس زای اجتماعی واستفاده از مشروبات الکلی (۵).

بیماری ایسکمیک قلبی در سال ۲۰۱۰ علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان بود (۱۰)، با این حال، بسیاری از بیماران سکته قلبی حاد (AMI) زنده مانده و بسیاری از بزرگسالان زنده با علائم ناتوان کننده آژین پکتوریس پایدار یا ایسکمیک نارسایی قلبی زندگی می‌کنند. اندازه گیری بار جهانی IHD نیاز به تخمین میزان مرگ و میر، شیوع و ناتوانی ناشی از IHD در مردان و زنان براساس سن و منطقه جهانی دارد، بروز IHD غیر کشنده و شیوع همیشه با مرگ و میر IHD ارتباط ندارد، به عنوان مثال، درمان بیماری IHD حاد و مزمن ممکن است، منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از IHD و افزایش جمعیت بازماندگان مزمن Global Burden IHD شود(۱۱). مطالعه بار جهانی بیماری‌ها (of Disease of the Heart and Stroke) مشترکی بین سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی و دانشگاه هاروارد بود که در سال ۱۹۸۸ آغاز شد و بار جهانی بیماری‌ها را برآورده می‌کند، هم چنین GBD بار جهانی بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطربه وسیله سال‌های ناتوانی تعديل شده بر اساس سن (Disability-Adjusted

در کشورهای در حال توسعه که چهار پنجم از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، بیماری‌های غیرواگیر به سرعت در حال جایگزین شدن به جای بیماری‌های واگیر هستند (۱-۲)، بیماری‌های غیرواگیر (Non-communicable disease) به عنوان چالش بهداشت عمومی غالب قرن ۲۱ شناخته می‌شوند (۳).

بیماری‌های غیرواگیر عامل تقریباً دو سوم از کل مرگ‌های جهانی برآورد شده است، این برآورد با گذشت زمان به طور مداوم از ۲۶/۸ میلیون مرگ در سال ۱۹۹۰ به ۴۱/۱ میلیون مرگ در سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان افزایش یافته است (۴)، نکته مهم این است که بیماری‌های غیرواگیر تنها مشکل کشورهای با درآمد بالا نیستند، تقریباً ۸۰ درصد از مرگ‌های زودرس منتبه به بیماری‌های غیرواگیر در مناطق با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد (۵).

در شروع قرن بیستم اختلال قلبی و عروقی به عنوان یک بیماری غیرواگیر کم تراز ۱۰ درصد از کل مرگ‌ها در جهان را شامل می‌شد، در حالی که در اوخر این قرن بیماری‌های قلبی و عروقی نزدیک به نیمی از کل مرگ و میر کشورهای پیشرفته و حدود ۲۵ درصد از مرگ و میر کشورهای در حال توسعه را شامل می‌شود (۶).

بیماری‌های قلب و عروق اصلی‌ترین علت مرگ و میرو ناتوانی در سراسر جهان است، این بیماری‌ها در سال ۲۰۱۵ مسئول ۱۷/۷ میلیون مرگ در سراسر جهان بوده‌اند که ۷/۴ میلیون نفر از این مرگ‌ها به دلیل بیماری عروق کرونر قلب بوده است (۷) در ایران نیز بیماری‌های قلب و عروق اصلی‌ترین




مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رشد پنهان خطی (LGM) بوده است، فرمول مدل مورد استفاده به معادله (۱) است:

$$\begin{aligned} y_{ti} &= \eta_{0i} + \eta_{1i}\lambda_t + \varepsilon_{ti} \\ \eta_{0i} &= \eta_0 + \varepsilon_{0i} \\ \eta_{1i} &= \eta_1 + \varepsilon_{1i} \end{aligned} \quad \text{معادله ۱}$$

در معادله (۱)  $y_{ti}$  مقدار متغیر پاسخ مشاهده شده مربوط به نمونه  $i$  ام در زمان  $t$  متغیر تصادفی  $\eta_{1i}$  و  $\eta_{0i}$  به ترتیب عامل های پنهان عرض از مبدأ و شبیه خط و  $\lambda_t$  ها بار های عاملی هستند که روند ها رادر طول زمان بر روی متغیر پاسخ توصیف میکنند. هم چنین  $\varepsilon_{0i}$  و  $\varepsilon_{1i}$  بیانگر جمله خطای تصادفی و  $\eta_0$  و  $\eta_1$  به ترتیب میانگین عرض از مبدأ (میانگین متغیر پاسخ در شروع مطالعه) و میانگین شبیه خط (میانگین تغییرات متغیر پاسخ در طول زمان) را نشان می دهند، مدل رشد پنهان خطی در نمودار (۱) آورده شده است.

در این تحقیق با استفاده از مدل رشد پنهان خطی و نرم افزار Amos داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، کد اخلاق این تحقیق IR.SSU.SPH.REC.1399.089 است.



نمودار ۱: دیاگرام مفهومی مدل منحنی رشد پنهان خطی

(Life Year DALYs) را بررسی کرده است، DALYs برابر با مجموع سال های زندگی از دست رفته به دلیل مرگ زودهنگام مربوط به بیماری Years of Life Lost (YLL) و سال های زندگی با ناتوانی Years Lost due to Disability (YLD) در افرادی که با وجود بیماری مزمن زنده مانده اند، است.

با انتخاب واحد زمان به عنوان واحد سنجش، می توان بار ناشی از پیامدهای غیرکشنده بیماری ها و آسیب ها را با زمان از دست رفته به دلیل مرگ نابهنجام جمع شوند و شاخصی به دست آید که مجموع معلولیت همراه با بیماری و مرگ به نام دالی (DALY) را اندازه گیری می کند. یک دالی (DALY) به معنی یک فاصله یک ساله که بین سلامت واقعی جامعه با سلامت پنداشته یک جامعه امکان پذیر بر اساس امید به زندگی استاندارد وجود دارد (۱۲).

یک سوال طبیعی از لحاظ علمی و اهمیت بهداشت عمومی، چگونگی روند بار بیماری های قلبی و عروقی است، که در این مطالعه به بررسی روند جهانی و منطقه ای دالی بیماری های قلبی و عروقی طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ با استفاده از مدل رشد پنهان پرداخته شده است.

### روش بررسی

این تحقیق از نوع مدل سازی روی داده های ثانویه است، در این تحقیق داده های مربوط به نرخ DALY, YLD, YLL بیماری قلبی و عروقی طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ مربوط به کشور جهان به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است، که با مراجعه به سایت Institute for Health Metrics and Evaluation


and Evaluation توسط تیم دو نفره استخراج شده است.



دالی بیماری قلبی عروقی در ۷ سوپر منطقه دنیا و کشور ایران در نمودار ۲ آورده شده و نتایج برآذش مدل رشد پنهان به داده‌های YLL، YLD، DLY مربوط به بیماری قلبی و عروقی ۷ سوپر منطقه جهان به ترتیب در جداول ۱، ۲ و ۳ خلاصه شده است.

## یافته‌ها

در این تحقیق داده‌های مربوط به ۷ سوپر منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در ابتدا با استفاده از مدل رشد پنهان به بررسی روند متغیرهای تحقیق در طول زمان پرداخته شده است، روند



نمودار ۲: روند دالی بیماری قلبی عروقی در ۷ سوپر منطقه دنیا و کشور ایران

جدول ۱: نتایج برآذش مدل رشد پنهان به داده‌های DLY مربوط به بیماری قلبی و عروقی ۷ سوپر منطقه جهان

سوپر منطقه	سال	ضرایب مدل رشد پنهان				
		۱۹۹۷	۲۰۰۲	۲۰۰۷	۲۰۱۲	۲۰۱۷
اروپای مرکزی-شرق اروپا-آسیای میانه						
میانگین ثابت رشد = $1067/3^{**}$	۹۵۷۶/۲	۹۶۲۲/۰	۹۶۴۰/۵	۹۶۴۳/۴	۹۷۴۷/۲	۹۷۴۷/۲
ضریب رشد = $-274/79^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $3492/65^*$	۵۵۳۱/۷	۵۳۲۴/۸	۵۲۲۸/۸	۵۲۳۴/۲	۵۲۴۳/۴	۵۲۴۳/۴
ضریب رشد = $42/7^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $3492/65^{**}$	۴۱۴۳/۳	۴۰۲۶/۴	۳۸۶۶/۳	۳۶۱۹/۶	۳۶۳۱/۱	۳۶۳۱/۱
ضریب رشد = $154/14^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $5277/1^{**}$	۳۹۲۹/۳	۳۹۰۵/۹	۴۲۳۷/۳	۴۸۱۴/۰	۵۳۶۹/۴	۵۳۶۹/۴
ضریب رشد = $-450/15^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $3399/9^{**}$	۳۹۹۵/۴	۳۶۹۲/۱	۳۵۰۴/۸	۳۴۸۸/۱	۳۷۷۲/۴	۳۷۷۲/۴
ضریب رشد = $97/28^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $4414/91^{**}$	۳۷۲۹/۹	۳۶۲۵/۱	۳۸۰۲/۶	۴۱۴۷/۰	۴۴۸۸/۶	۴۴۸۸/۶
ضریب رشد = $-265/66^{**}$						
میانگین ثابت رشد = $3447/84^{**}$	۴۱۴۳/۳	۴۰۲۶/۴	۳۸۶۶/۳	۳۶۱۹/۶	۳۶۳۱/۱	۳۶۳۱/۱
ضریب رشد = $-220/33^{**}$						
شمال آفریقا و خاورمیانه						
آمریکای لاتین و کارائیب						
جنوب صحرا ای آفریقا						

\* معنی دار در سطح ۵ درصد.

\*\* معنی دار در سطح ۱ درصد.



جدول ۲: نتایج برآذش مدل رشد پنهان به داده های YLD مربوط به بیماری قلبی و عروقی ۷ سوپر منطقه جهان

سال	سوپر منطقه					
	ضایع مدل رشد پنهان	۲۰۱۷	۲۰۱۲	۲۰۰۷	۲۰۰۲	۱۹۹۷
اروپای مرکزی- شرق اروپا- آسیا میانه	میانگین ثابت رشد = $644/23^{**}$	۸۷۰/۴	۸۱۶/۸	۷۵۳/۱	۷۰۳/۴	۶۶۵/۶
	ضریب رشد = $57/76^*$					
جنوب شرقی آسیا ، آسیای شرقی و اقیانوسیه	میانگین ثابت رشد = $312/54$	۴۱۲/۰	۳۷۴/۹	۳۴۵/۴	۳۲۴/۱	۳۰۸/۹
	ضریب رشد = $25/14^*$					
آسیای جنوبی	میانگین ثابت رشد = $211/12^{**}$	۲۷۸/۶	۲۵۵/۵	۲۷۳/۹	۲۲۲/۰	۲۱۲/۰
	ضریب رشد = $13/14^{**}$					
کشورهای با درآمد بالا	میانگین ثابت رشد = $552/21^{**}$	۶۳۹/۴	۶۰۷/۹	۵۸۳/۹	۵۷۲/۳	۵۶۸/۹
	ضریب رشد = $20/30^{**}$					
آمریکای لاتین و کارائیب	میانگین ثابت رشد = $271/74$	۳۷۴/۴	۳۴۰/۶	۳۱۲/۶	۲۹۰/۹	۲۷۸/۰
	ضریب رشد = $24/11^{**}$					
شمال آفریقا و خاورمیانه	میانگین ثابت رشد = $265/12^{**}$	۲۶۸/۰	۲۶۸/۰	۲۶۸/۰	۲۶۸/۰	۲۶۸/۰
	ضریب رشد = $14/16^{**}$					
جنوب صحرای آفریقا	میانگین ثابت رشد = $195/93^{**}$	۲۷۸/۶	۲۵۵/۵	۲۳۷/۹	۲۱۲/۰	۲۱۲/۰
	ضریب رشد = $0/640$					

\* معنی دار در سطح ۵ درصد.  
\*\* معنی دار در سطح ۱ درصد.

جدول ۳: نتایج برآذش مدل رشد پنهان به داده های YLL مربوط به بیماری قلبی و عروقی ۷ سوپر منطقه جهان

سال	سوپر منطقه					
	ضایع مدل رشد پنهان	۲۰۱۷	۲۰۱۲	۲۰۰۷	۲۰۰۲	۱۹۹۷
اروپای مرکزی- شرق اروپا- آسیا میانه	میانگین ثابت رشد = $10024/75^{**}$	۸۷۰۵/۸	۸۸۰۵/۱	۹۷۳۱/۳	۹۷۴۷/۰	۹۵۷۷/۸
	ضریب رشد = $-3269^{**}$					
جنوب شرقی آسیا ، آسیای شرقی و اقیانوسیه	میانگین ثابت رشد = $4890/42^{**}$	۴۸۶۸/۴	۴۹۳۸/۵	۴۹۶۸/۴	۴۹۳۴/۳	۴۹۳۴/۴
	ضریب رشد = $135/1$					
آسیای جنوبی	میانگین ثابت رشد = $3228^{**}$	۴۱۴۳/۳	۴۰۲۶/۴	۳۸۶۶/۳	۳۶۱۹/۶	۳۶۳۱/۱
	ضریب رشد = $135/1$					
کشورهای با درآمد بالا	میانگین ثابت رشد = $4724/1^{**}$	۳۹۲۹/۳	۳۹۰۵/۹	۴۲۴۷/۳	۴۸۱۴/۰	۵۴۶۹/۴
	ضریب رشد = $-471/30^{**}$					
آمریکای لاتین و کارائیب	میانگین ثابت رشد = $3121/8^{**}$	۳۳۷/۹	۳۳۱/۰	۳۲۷/۶	۳۲۱/۴	۳۱۴/۱
	ضریب رشد = $73/17$					
شمال آفریقا و خاورمیانه	میانگین ثابت رشد = $150/63^{**}$	۳۷۲۹/۹	۳۶۲۵/۱	۳۸۰۲/۶	۴۱۴۷/۰	۴۴۸۸/۶
	ضریب رشد = $-279/84^{**}$					
جنوب صحرای آفریقا	میانگین ثابت رشد = $3252/57^{**}$	۲۴۷۸/۸	۲۵۹۷/۰	۲۷۷۵/۸	۳۰۱۱/۲	۳۲۳۰/۷
	ضریب رشد = $-220/83^{**}$					

\* معنی دار در سطح ۵ درصد.  
\*\* معنی دار در سطح ۱ درصد.



این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۵۲۷۷/۱ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست.

ضریب رشد نرخ DLY برای این منطقه برابر با ۴۵۰/۸۵- شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۴۵۰/۸۵- طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است. برای سوپر منطقه آمریکای لاتین و کارائیب میانگین ثابت رشد برابر ۳۳۹۹/۹ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۳۳۹۹/۹ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ DLY برای این منطقه برابر با ۹۷/۲۸ شده که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۹۷/۲۸ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

برای سوپر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه که شامل کشور ایران نیز است، میانگین ثابت رشد برابر ۴۴۱۴/۹۱ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۳۶۰.۹۳ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست و ضریب رشد نرخ DLY برای این منطقه برابر با ۲۶۵/۶۶- شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۲۶۵/۶۶- طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است.

برای این سوپر منطقه میانگین ثابت رشد برابر ۳۴۴۷/۸۴ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۳۴۴۷/۸۴ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست.

بار جهانی بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطر به وسیله سال‌های ناقوانی (DLY): با توجه نتایج جدول ۱ برای سوپر منطقه اروپای مرکزی، اروپای شرقی و آسیای میانه میانگین ثابت رشد برابر ۱۰۶۷۸/۳ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۱۰۶۷۸/۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ DLY برابر با ۲۷۴/۷۹ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۲۷۴/۷۹ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است. برای سوپر منطقه جنوب شرقی آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه میانگین ثابت رشد برابر ۵۱۸۹/۶ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۵۱۸۹/۶ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست و ضریب رشد نرخ DLY برابر با ۴۲/۷ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۴۲/۷ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

برای سوپر منطقه آسیای جنوبی میانگین ثابت رشد برابر ۳۴۹۲/۶۵ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ DLY برابر با ۳۴۹۲/۶۵ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ DLY برای این منطقه برابر با ۱۵۴/۱۴ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۱۵۴/۱۴ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است. برای سوپر منطقه کشورهای با درآمد بالا میانگین ثابت رشد برابر ۵۲۷۷/۱ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به



YLD با شیب ۱۳/۱۴ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

برای سوپر منطقه کشورهای با درآمد بالا میانگین ثابت رشد برابر ۵۵۲/۲۱ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۵۵۲/۲۱ سالبه ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست.

ضریب رشد نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۲۰/۳۰ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLD با شیب ۲۰/۳۰ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

برای سوپر منطقه آمریکای لاتین و کارائیب میانگین ثابت رشد برابر ۲۷۱/۷۴ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۲۷۱/۷۴ سالبه ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۲۴/۱۱ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLD با شیب ۲۴/۱۱ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است. برای سوپر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه که شامل کشور ایران نیز است، میانگین ثابت رشد برابر با ۲۶۵/۱۲ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۲۶۵/۱۲ سالبه ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۱۴/۱۶ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLD با شیب ۱۴/۱۶ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

ضریب رشد نرخ DLY برابر برای این منطقه با ۲۲۰/۳۳ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ DLY با شیب ۲۲۰/۳۳ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است.

سالهای زندگی با ناتوانی (YLD) (باتوجه به نتایج جدول ۳ برای سوپر منطقه اروپای مرکزی، اروپای شرقی و آسیای میانه میانگین ثابت رشد برابر ۶۶۴/۲۳ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۶۶۴/۲۳ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLD برابر برای این منطقه با ۵۷/۷۶ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLD با شیب ۵۷/۷۶ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است. برای سوپر منطقه جنوب شرقی آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه میانگین ثابت رشد برابر ۳۱۲/۵۴ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۳۱۲/۵۴ سالبه ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. همچنین ضریب رشد نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۲۵/۱۴ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLD با شیب ۲۵/۱۴ طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است، برای سوپر منطقه آسیای جنوبی میانگین ثابت رشد برابر ۲۱۲/۱۲ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برابر با ۲۱۲/۱۲ سالبه ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۱۳/۱۴ شده است، که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که نرخ



است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۱/۱۰ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۱/۱۰ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه کشورهای با درآمد بالا میانگین ثابت رشد برابر ۱/۱۵ ۴۷۲۴ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۱/۱۵ ۴۷۲۴ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. هم چنین ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۱/۳۱- شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۱/۳۱- طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است.

با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه آمریکای لاتین و کارائیب که شامل کشور ایران نیز است، میانگین ثابت رشد برابر ۳۱۳۱/۸۳ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۳۱۳۱/۸۳ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست.

هم چنین ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۷۳/۱۷ شده است که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۷۳/۱۷ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است. با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه میانگین ثابت رشد برابر ۱۵۰/۶۳ ۱۵۰/۶۳ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۱۵۰/۶۳ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست.

همچنین با توجه به نتایج جدول ۲، برای سوپر منطقه جنوب صحرای آفریقا میانگین ثابت رشد برابر ۱۹۵/۹۳ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLD برای این منطقه برابر با ۱۹۵/۹۳ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست و ضریب رشد نرخ YLD برابر با ۰/۶۴۰ شده است که در سطح ۰/۰۵ معنی دار نیست.

سال‌های زندگی از دست رفته به دلیل مرگ زودهنگام مربوط به بیماری (YLL): با توجه نتایج جدول ۳ برای سوپر منطقه اروپای مرکزی- شرق اروپا- آسیای میانگین ثابت رشد برابر ۱۰۰/۷۵ ۱۰۰/۷۵ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۱۰۰/۷۵ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۳۲۶/۹۰- شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۲/۷۴ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است. با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه جنوب شرقی آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه میانگین ثابت رشد برابر ۴۸۹۰/۴۲ ۴۸۹۰/۴۲ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است، به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۴۸۹۰/۴۲ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفراست. ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۱۷/۸۲ ۱۷/۸۲ شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شیب ۱۷/۸۲ طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند افزایشی داشته است.

با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه آسیای جنوبی میانگین ثابت رشد برابر ۳۲۸۸ ۳۲۸۸ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار



موضوع است، که نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در شروع مطالعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده است. در مجموع با توجه به مثبت بودن ضرایب رشد نرخ Latin America and Southeast Asia, East و South Asia, Caribbean و Oceania روند نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در این مناطق صعودی بوده است و با توجه به منفی بودن ضرایب رشد نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در Europe and Central و Central Europe, Eastern مناطق North Africa and و High-income countries، Asia Sub-Saharan Africa و Middle East روند نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در این مناطق نزولی بوده است، درواقع افزایش جمعیت و رشد جمعیت در بسیاری از مناطق باعث افزایش بار DALY در سراسر جهان شده است. این یافته با صعود بیماری های مزمن و غیرواگیر که به طور کلی رخداده است، همخوانی دارد (۵). آندریو و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیقی نشان دادند، در سطح جهانی، بروز سکته قلبی حاد استاندارد شده و شیوع آنژین از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ کاهش یافته است و شیوع نارسایی قلبی ایسکمیک از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ افزایش یافته است. علیرغم کاهش سن مرگبار استاندارد شده و IHD بدون مرگ و میر از سال ۱۹۹۰ در بیشتر مناطق، رشد جمعیت و پیری منجر به بار جهانی IHD در سال ۲۰۱۰ شده است (۱۳).

در توزیع مرگ و میر بیماری قلبی و عروقی جهانی و انتساب عوامل خطر بین ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ با استفاده از مطالعه بار جهانی

هم چنین ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۲۷۹/۸۴- شده است، که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شبیه ۲۷۹/۸۴- طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است.

با توجه به نتایج جدول ۳، برای سوپر منطقه جنوب صحرای آفریقا میانگین ثابت رشد برابر ۳۲۵۲/۵۷ شده که در سطح ۰/۰۱ معنی دار است به این معنی که در این منطقه میانگین اولیه نرخ YLL برابر با ۳۲۵۲/۵۷ ساله ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. هم چنین ضریب رشد نرخ YLL برابر با ۲۲۰/۸۳- شده است که در سطح ۰/۰۵ معنی دار است، به این معنی که نرخ YLL با شبیه ۲۲۰/۸۳- طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ روند کاهشی داشته است.

## بحث و نتیجه گیری

بار جهانی بیماری های قلبی و عروقی طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ تصویری مخلوط ارائه می دهد: میانگین نرخ DALY بیماری قلبی و عروقی در ۷ منطقه مورد بررسی تنوع گسترده ای را با کم ترین و بیش ترین مقدار دارد، هم چنین نتایج نشان داده است، که ضریب رشد نرخ DALY بیماری قلبی عروقی طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ در منطقه High-income countries نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده است، که بیانگر کاهش سریع تر نرخ DALY بیماری قلبی عروقی در این منطقه نسبت به سایر مناطق است و میانگین Central ثابت نرخ DALY بیماری قلبی عروقی برای منطقه Europe, EasternEurope, and Central Asia نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین مقدار است، که نشان دهنده این



بوده است، که بیانگر کاهش سریع تر نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در این منطقه نسبت به سایر مناطق است و میانگین ثابت Central Europe, نرخ YLL قلبی عروقی برای منطقه EasternEurope, and Central Asia نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین مقدار است، که نشان دهنده این موضوع است، که نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در شروع مطالعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده است.

در مجموع با توجه به مثبت بودن ضرایب رشد نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در مناطق Southeast Asia, East Asia, و South Asia, Caribbean and Oceania روند نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در این مناطق صعودی بوده است و با توجه به منفی بودن ضرایب رشد Sub-Saharan نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در مناطق North Africa and High-income countries، Africa Central Europe, EasternEurope, and Middle East Central Asia روند نرخ YLL بیماری قلبی عروقی در این مناطق نزولی بوده است.

نتایج مورد بررسی برای کشور ایران نشان داد که میانگین DALY بیماری قلبی و عروقی برابر با ۳۹۶۶/۳ سال شده است، میانگین YLD برابر با ۳۱۸/۷ سال و میانگین YLL برابر با ۳۶۴۷/۶ سال شده است، نتایج تحقیق ابراهیمی و همکاران (۱۳۹۶) نشان دادند که کل تعداد سال‌های از دست رفته عمر به ۵۳۸۰۴ دلیل مرگ و یا ناتوانی ناشی از بیماری قلبی و عروقی ۱۷/۷ در هزار نفر) برآورده شده است، برآورد تعداد سال‌های از دست رفته عمر به دلیل ناتوانی ناشی از بیماری قلبی و عروقی برابر با ۱۶۳۳/۷۲ (۰/۵۴ در هزار نفر) شده است و برآورد تعداد

(۲۰۱۷GBD) سایپرز، باشگاه دانش در سطح جهان، تخمین زده می‌شود ۱۷/۸ میلیون پوند (۱۰۰،۰۰۰ در ۲۳۳/۱) نفر در سال ۲۰۱۷ به دلیل CVD فوت کردند. میزان مرگ CVD در کشورهای با درآمد بالا کاهش یافته است (۱۹۹۰: ۲۷۱/۸٪، ۲۰۱۷: ۲۷۰/۹٪، ۲۰۱۸: ۱۲۸/۵٪) UI (فاصله عدم قطعیت)، (۲۰۱۷: ۲۷۳/۵-۲۷۰/۹٪)، (۱۹۹۰: ۳۶۸/۲٪، ۲۰۱۷: ۳۳۵/۶٪)، (۲۰۱۷: ۳۳۸۳/۳-۳۳۵/۶٪)، (۱۳۰/۷-۱۲۶/۴٪) در هر ۱۰۰،۰۰۰ در حالی که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ثابت باقی مانده است (۱۹۹۰: ۳۰۷٪، ۲۰۱۷: ۳۲۵/۵٪) در هر ۱۰۰۰۰.

نتایج مربوط به ناتوانی ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی (YLD) نشان داده است، که ضریب رشد نرخ YLD بیماری قلبی عروقی طی سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ در منطقه Central Europe, EasternEurope, and Central YLD بیشتر بوده است، که بیانگر رشد سریع تر نرخ YLD بیماری قلبی عروقی در این منطقه نسبت به سایر مناطق است و میانگین ثابت نرخ YLD بیماری قلبی عروقی برای این منطقه نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین مقدار است که نشان دهنده این موضوع است، که نرخ YLD بیماری قلبی عروقی در شروع مطالعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده است.

در مجموع با توجه به مثبت بودن ضرایب رشد نرخ YLD بیماری قلبی عروقی در ۷ منطقه مورد بررسی روند نرخ YLD بیماری قلبی عروقی صعودی بوده است.

هم چنین نتایج مربوط به مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی (YLL) نشان داده است، که ضریب رشد نرخ YLL بیماری قلبی عروقی طی سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۷ در منطقه High-income countries نسبت به سایر مناطق بیشتر



منطقی و سطح حداقل خطر امکان پذیر نیز در زنان بیشتر از مردان بود.

### تضاد منافع

نویسنده‌گان این مقاله اعلام می‌دارند، هیچ گونه تضاد منافعی ندارد.

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) یزد و کلیه کسانی که به نحوی در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

سال‌های از دست رفته به دلیل مرگ زودرس ناشی از بیماری قلبی و عروقی برابر با ۵۲۱۷۰/۲۸ (۱۷/۱ در هزار نفر) شده است (۱۰).

کرمی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی سهم تأثیر بالقوه برخی عوامل خطر تعديل پذیر در بار بیماری‌های قلبی-عروقی در ایران به این نتیجه رسیدند که اثر مشترک عوامل خطر انتخابی در سطح حداقل خطر تئوریک در زنان ۵۹/۴ درصد و در ۳۷ درصد از بار بیماری‌های قلبی-عروقی قابل اجتناب است. اثر مشترک عوامل خطر انتخابی در سطح حداقل خطر

## References

- 1-Jamison DT, Mosley WH. Disease control priorities in developing countries: health policy responses to epidemiological change. American journal of public health.1991;81(1):15-22.
- 2-Murray CJ, Lopez AD, World Health Organization. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020: summary. World Health Organization.1996; 6-20.
- 3-WHO: Health situation and trend assessment. [http://www.searo.who.int/entity/health\\_situation\\_trends/data/ncd\\_ncd-deaths/en/](http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/ncd_ncd-deaths/en/). Accessed on 3/11/2019.
- 4-Safiri S, Kolahi AA, Cross M, et al. Prevalence, Deaths, and Disability-Adjusted Life Years Due to Musculoskeletal Disorders for 195 Countries and Territories 1990–2017. Arthritis & Rheumatology.2021;73(4):702-14.[Persian]
- 5-Jagannathan R, Patel SA, Ali MK, Narayan KV. Global updates on cardiovascular disease mortality trends and attribution of traditional risk factors. Current diabetes reports.2019;19(7):1-2.
- 6-Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, Newman WP, Tracy RE, Wattigney WA. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. New England journal of medicine.1998;338(23):1650-6.
- 7-World Health Organization [homepage on the Internet] 1.[cited February 2018]. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs/en/>.



- 8- Forouzanfar MH, Sepanlou SG, Shahraz S, et al. Evaluating causes of death and morbidity in Iran, global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2010. Archives of Iranian medicine. 2014;17(5):0-. [Persian]
- 9-Aghamohammadi S, Kazemi E, Khosravi A, Kazemeini H. The trend of ten leading causes of death in the Islamic Republic of Iran, 2006-2011. Iranian Journal of Epidemiology. 2017;12(4):1-1. [Persian]
- 10-Moran AE, Forouzanfar MH, Roth GA, Mensah GA, Ezzati M, Flaxman A, Murray CJ, Naghavi M. The global burden of ischemic heart disease in 1990 and 2010: the Global Burden of Disease 2010 study. Circulation. 2014;129(14):1493-501.
- 11- Rajaratnam JK, Marcus JR, Flaxman AD, et al. Neonatal, postneonatal, childhood, and under-5 mortality for 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 4. The Lancet. 2010;375(9730):1988-2008.
- 12-Murray CJ, Lopez AD, World Health Organization. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020: summary. World Health Organization. 1996.
- 13-Ebrahimi K, SalariLak Sh, KhademWatan K. Determining the health burden of a heart attack. Journal of Medical School, Tehran University of Medical Sciences. 2017; 75(3): 208-2. [Persian]